

ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ

тему борьбы подробно разбирали [вот здесь](#)

На что хочу обратить ваше внимание:

- красные пятна у Лираты – обязательно проверяем на клеща, может быть вариант нормы, но на клеща проверить обязаны)
- липкие пятна на калатеях / стромантах / марантах – повод поискать клеща, да и не только его
- никаких хедер(
- у многих алоказий клещ селится на верхней стороне листа, нижняя может быть абсолютно чистой
- если засыхают новые маленькие точки роста – ищем клеща, на листьях даже может не быть симптомов, а он есть
- деформация листьев новых молодых (наблюдала такое часто у фикусов, и даже у эпипремнумов), равно как измельчание листа на новом приросте лиан – проверяем на клеща
- если думаете что на замиокулькасах нет клещей и не обрабатываете их вместе со всеми – будет рассадником клещей, симптомов не увидите, но они вместе существуют



ВРЕДИТЕЛИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ – ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЩ

Мы меры борьбы не разбирали, но они практически такие же как и паутинный клещ, только надо сокращать перед обработки – 1 раз в 4-5 дней, не больше.

тему борьбы подробно разбирали [вот здесь](#). Отличие у прозрачного что надо шприцом будет заливать раствор во все не раскрывшиеся трубочки и листики.

И особенности диагностики:

- не всегда борозды на листьях и поплывшая краска на обратной стороне марганцовых – это признак прозрачного клеща, тут именно нужно сочетание несколько факторов – поражение черешка листа + поплывшая краска + бороздки
- либо лист выходит из трубочки уже сухой по краю (не только кончик, но и весь край листа) + поплывшая краска обратной стороны
- в целом поплывшая краска это косвенный признак – висим такое, осматриваем на другие признаки, если к поплывшей краске присоединяется еще какой-то симптом – тут можно говорить твердое да, если ТОЛЬКО поплывшая краска – то нет, надо наблюдать дальше.

На геснериевых (фиалки, эписции, стрептокактусы, и тд) паразитируют два вида из этой группы клещей – цикламеновый (земляничный) клещ (Phytonemus pallidus от же Tarsonemus pallidus) и оранжевый прозрачный клещ (Polyphagotarsonemus latus, он же Hemitarsonemus latus). Вот на марантовых встречается часто второй. Но пока в микроскоп его не поймала.

P.S. [Есть группа про марантовые ВК](#)

я там часто сижу именно по фоткам с прозрачным клещом – смотрю симптомы на разных марганцовых у людей, это для тренировки насмотренности тоже можно практиковать, кому хочется задрочиться
Фотки к этому посту часть взята из этой группы кстати и из моего гайда по вредителям.



ВРЕДИТЕЛИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ – ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ТРИПС

тему борьбы подробно разбирали [вот здесь](#), ниже посты после этого

На что хочу обратить ваше внимание:


- трипсы есть разные, быстро размножаются и нет, есть которых вы найдете днем, есть которых только ночью. Если днем никого не видите – осмотрите растения с фонариком ночью
- обязательно осматривайте трубочки не раскрутившиеся, молодые листики
- если есть цветущие (фиалки, фаленопсисы, эписции, стефанотис, жасмин и тд – все у кого прямо видно цветок) – осматривайте и внутри цветочков – трипсы обожают пыльцу.





личинки питаются в толще листа – отсюда проеденные ходы, + черные точки – экскременты



серебристые полосы



листья как бы соскобленные дорожками + черные точки экскременты трипса




личинки – желтовато-белые, очень подвижные



личинки



хамедорея съеденная трипсом



выскобленная поверхность листа + черные экскременты



личинки – обычно подвижные



выскобленная поверхность листа + черные экскременты + как бы серебристые дорожки



проеды в форме дорожек + черные точки (экскременты) + серебристый налет



личинки – обычно подвижные




выскобленная поверхность листа + взрослые трипсы



серебристые дорожки + черные экскременты



серебристые дорожки + черные экскременты



серебристые проходы / дорожки



деформация листьев из-за поражения трипсом



ВРЕДИТЕЛИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ – ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ТЛЯ

По окраске их куча: зеленые, бурые, красные, желтоватые, черные, серые, белесые и это даже еще не все.

Главная ошибка в диагностике – все время хочется спутать ее с белокрылой или пальмовой щитовкой. НО радует то что препараты одни и тем нужны что от тли, что от тех кто ей прикидывается.

Меры борьбы с тлей разбирали [вот здесь и ниже](#).

Обратите внимание на фото 1, 2, 3 – у тли есть бескрылые особи и летающие, вот на фото 3 посмотрите есть белые странные – не похожие на обычную тлю – это толи крылатая девственница, или крылатые мигранты, или крылатые самки-полоноски, короче какая-то крылатая стадия.

Тлю обычно обнаруживаем уже когда она расплодилась, единичных трудно заметить, но хорошая новость в том – что легко от нее избавиться дома, в огороде конечно сложнее)




ВРЕДИТЕЛИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ – ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ЩИТОВКА

По мне так самый приятный вредитель – сидит, ест, не двигается никуда. И как оказалось мы ее не разбирали(значит сделаем! Но забегая на будущее – используем системные препараты для пролива – по схеме с мучнистым червецом.

Самая коварная щитовка – это пальмовая, вывести крайне сложно.
Самая интересная – запятоновидная – часто обитает в розетке сансевиерий.




на сладкие выделения от щитовки присоединяется грибок, тут пример сажистого грибка



запятоновидная щитовка – часто встречается в основании листьев сансевиерий

черные точки – это норма, чешуйки, а вот белые точки – пальмовая щитовка



щитовка + присоединился грибок (темные пятна)



пальмовая щитовка




щитовка, очень много молодых




пальмовая щитовка



запятоновидная щитовка (любит сансы)




пальмовая щитовка



щитовка + липкий налет от ее питания (падь)



пальмовая щитовка



пальмовая щитовка



пальмовая щитовка

БЕЛОКРЫЛКА

Увидели белую красивую крупную аля-муху – включаем фумигатор. Главное не допустить массового распространения. Нужно сразу убить летающих взрослых, чтобы они больше не производили на свет потомство.

На самом деле легко выводится, если успели заметить.

[Про меры борьбы разговаривали тут](#)



МУЧНИСТЫЙ ЧЕРВЕЦ

А вот это самый узнаваемый из всех вредитель – и самый ужасный как по мне. Кажется вывел, все, не видно, а через месяц новая вспышка. Потому что яйца они свои прячут очень искусно.

[Про червеца и меры борьбы говорили вот тут](#)

Обнаружили – сразу снимаем, лучше ставьте на карантин, отдельно от всех растений. Есть довольно агрессивные виды, которые размножаются и перебегают на соседние растения очень быстро.

